



ข้อมูลพรรณไม้

ไม้รอเลื้อย
(scandent)

ลักษณะวิสัย
(habit)

รูปร่ม
(umbellate)
ความสูง2-3ม.
ความกว้าง
ทรงพุ่ม9ม.

เรือนยอด ทรงพุ่ม
(crown shape)

พืชบก
(terrestrial)

ถิ่นอาศัย
(habittat)

ลำต้นใต้ดิน
(underground stem)
เหง้า (rhizome)

ลำต้น
(stem)

ตั้งตรงเองไม่ได้
ใช้รากยึดเกาะ
(climbing root)

ลำต้นเหนือดิน
(aerial stem)

สี : เทาอมดำ
ลักษณะ : มีหนาม
ยาง : ไม่มี

เปลือกลำต้น

ใบประกอบ (compound leaf)
ขนนกปลายคี่ (odd-pinnate)

สี : เขียว
ขนาดแผ่นใบ กว้าง 5-10 ซม.
ยาว 15-18 ซม.

ใบ (leaf)

ขนาดแผ่นใบย่อย : กว้าง 4-5 ซม.
ยาว 13-15 ซม.

เวียน
(spiral)

การเรียงตัวของใบบนกิ่ง
(phyllotaxy)

รูปใบหอก
(lanceolate)

รูปร่างแผ่นใบ
(leaf shape)

เรียวแหลม
(acuminate)

ปลายใบ
(leaf apex)

มน
(obtuse)

โคนใบ
(leaf base)

เรียบ
(entire)

ขอบใบ
(leaf margin)

ดอกช่อ (inflorescence)

ช่อเชิงลดมีกาบ
(spadix)

ดอก (flower)

ตำแหน่งที่ออกดอก : ปลายยอด,
ซอกใบ ,ตามลำต้นหรือกิ่ง

กลีบเลี้ยง(calyx) : แยกจากกัน
(polysepalous) มีจำนวน 6 กลีบ
สีเหลือง

กลีบดอก(corolla) : แยกจากกัน
(polypetalous) มีจำนวน 6 กลีบ
สีเหลือง รูปดอกกล้วยไม้ (orchid)

เกสรเพศผู้(stamen) : มีจำนวนมาก
สีและลักษณะ สีน้ำตาล

เกสรเพศเมีย(pistil) : มีจำนวนมาก
สีและลักษณะ -

กลิ่น(scent): มีกลิ่นหอมจัดในเวลา
เย็นถึงค่ำ

ผลรวม
(multiple fruit)

ผล (fruit)



?

ผลสด
(fleshy fruit)

?

ผลแห้ง
(dry fruit)


สีของผล: ผลอ่อน สีเขียว
ผลแก่ สีเหลือง แดง

รูปร่างผล: รูปวงรี

ลักษณะพิเศษของผล : เงามัน

เมล็ด (seed)

จำนวน 1-2 เมล็ด สีของเมล็ด สีดำ
รูปร่างเมล็ด วงรี



การเวก (*Artabotrys siamensis* Miq.)

วงศ์ ANNONACEAE

กระดังงามีกลีบเลี้ยง 3 กลีบ สีเขียว แยกจาก
กันเป็นอิสระ กลีบดอก 6 กลีบ สีเหลือง เรียง
เป็น 2 วงๆ ละ 3 กลีบ โคนกลีบหนาและจุ่ม
เป็นกระเปาะ ล้อมรอบเกสรเพศผู้ซึ่งมีจำนวน
มาก และเรียงเวียนอัดกันแน่นเป็นกลุ่มบน
ฐานรองดอก เกสรเพศเมียจำนวนมากอยู่เป็น
กระจุกตรงกลางดอก

appendage
(รยางค์)

anther
(อับเรณู)

filament (ก้านชูอับเรณู)

stigma
(ยอดเกสรเพศเมีย)

ovary
(รังไข่)

ลิขสิทธิ์ของหน่วยปฏิบัติการวิจัยพรรณไม้ประเทศไทย ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

